

ADV PLA DE LLEIDA

30 de setembre de 2024

Benvolgut/a:

A continuació els enviem els tractaments a realitzar durant els pròxims dies per als diferents cultius.

AMETLLER: Un cop **FINALITZADA LA COLLITA** i fins a caiguda de fulles, es recomana realitzar una aportació d'adob en les finques on hi hagi hagut collita per tal de restituir les reserves per l'any vinent. Es recomana aplicar aproximadament un 25% de les necessitats anuals, 200 kg de 12-6-24 Soluble (la dosi pot variar segons la riquesa de l'adob utilitzat).

Després de la collita, per cicatritza les ferides produïdes durant la recol·lecció i prevenir el mal de peu, es recomana tractar amb:

Per 1.000 lt d'aigua	←	BROTOMAX	a	2,5 L
		SAVIA-ACTIV BORO	a	2 L
		OXICLORUR DE COURE 50%	a	2 Kg

CAIGUDA PREMATURA DE FULLA: En finques que s'ha tingut una afectació elevada de xanthonemes o taca ocre. Realitzar un tractament per provocar la caiguda prematura de fulles realitzar un tractament a partir del 10 d'octubre amb:

Per 1.000 lt. d'aigua	←	REPOSER	a	7,5 Kg
-----------------------	---	---------	---	--------

OLIVERA: Per prevenir infeccions de repilo, després de les pluges, es recomana realitzar el següent tractament:

Per 1.000 lt d'aigua	←	OXICLORUR DE COURE 50%	a	3 Kg
		LANZADERA POTASIO	a	2,5 L

En cas de tenir captures elevades de MOSCA podeu realitzar un tractament amb els següents productes autoritzats en funció del termini de seguretat de cadascun:

MOSPILAN MAX (ACETAMIPRID 20%)	a	300 g/ha	TS: 28d
	O		
CORAZA (DELTAMETRINA 2,5%)	a	0,5 L/ha	TS: 7d

HERBICIDES: En cas de presència de males herbes, s'aconsella realitzar una aplicació per al seu control amb:

Per 400 lt. d'aigua	←	HERBOLEX	a	4 L
		MCPA	a	2 L
		RUEDO	a	0,1 mL

POMERA i PERERA: PREVENCIÓ DE FOC BACTERIÀ, realitzar un tractament a caiguda de fulles:

Per 1.000 lt. d'aigua	←	KDOS	a	3 kg.
-----------------------	---	------	---	-------

Igualment, és MOLT IMPORTANT ELIMINAR RE-FLORACIONS que puguin sortir d'ara fins a caiguda de fulles, ja que l'entrada del bacteri a l'arbre és per aquest òrgan.

En finques on hi hagi hagut antecedents de **STEMPHILLIUM** és recomanable, per tal d'eliminar l'inòcul per l'any següent, realitzar un tractament amb **CONDOR** a una dosi de 1 kg/ha abans de la caiguda de fulles. Posteriorment realitzar un altre tractament amb **SOLFOUREA** a raó de 15 L per 1000 d'aigua juntament amb el coure.

En parcel·les amb problemes de **FITOPHTORA** o amb **ARBRES DÈBILS** realitzar un tractament amb

Per 1.000 lt. d'aigua	←	KATANGA EXPRESS (Fosetil-Al 80%)	a	3 kg.
-----------------------	---	----------------------------------	---	-------

FRUITA DE PINYOL: En totes les varietats es recomana després de collir l'aplicació per la prevenció de **XANTHOMONAS ARBORICOLA** i altres malalties fúngiques:

Per 1.000 lt. d'aigua	←	KDOS	a	1.5 kg.
-----------------------	---	------	---	---------

En parcel·les amb problemes de **FITOPHTORA**, mal de coll o arbres dèbils, es pot realitzar un tractament **via foliar** amb:

Per 1.000 lt d'aigua	←	BROTOMAX	a	2.5 L.
----------------------	---	----------	---	--------

O si el problema és greu, per **via goter** amb:

Per 1 ha	←	VALCURE	a	2.5 L.
----------	---	---------	---	--------

HERBICIDES:

Per 400 lt. d'aigua	←	INTEIKE	a	0,6 L
		HERBOLEX	a	4 L
		MCPA	a	2 L

ADV PLA DE LLEIDA