



15 de setembre de 2025

Benvolgut/a:

A continuació els enviem els tractaments a realitzar durant els pròxims dies per als diferents cultius.

AMETLLER: Un cop **FINALITZADA LA COLLITA** i fins a caiguda de fulles, es recomana realitzar una aportació d'adob en les finques on hi hagi hagut collita per tal de restituir les reserves per l'any vinent. Es recomana aplicar aproximadament un 25% de les necessitats anuals, 150 kg de 20-7-10 (la dosi pot variar segons la riquesa de l'adob utilitzat). També és molt important continuar regant després de la collita per afavorir la recuperació de les reserves.

Es recomana realitzar un tractament foliar per ajudar a emmagatzemar reserves per l'any vinent i prevenir el mal de coll:

Per 1.000 lt d'aigua	←	BROTOMAX	a	2,5 L
		BOR	a	2 L
		CUPROCOL	a	1 L

A partir de **CAIGUDA DE FULLES** es recomana realitzar un tractament general de desinfecció contra FONGS amb:

Per 1.000 lt d'aigua	←	KARBICURE	a	2,5 Kg
		OXICOOP 50	a	2,5 Kg

CAIGUDA PREMATURA DE FULLA: Per provocar la caiguda prematura de fulles realitzar un tractament a partir del 10 d'octubre amb:

Per 1.000 lt. d'aigua	←	REPOSER	a	7,5 Kg
-----------------------	---	---------	---	--------

OLIVERA: Per prevenir infeccions de repilo, després de les pluges, es recomana realitzar el següent tractament:

Per 1.000 lt d'aigua	←	OXICOOP 50	a	2,5 Kg
		LANZADERA POTASIO	a	2,5 L

En cas de tenir captures elevades de MOSCA podeu realitzar un tractament amb els següents productes autoritzats en funció del termini de seguretat de cadascun:

GAZEL	a	300 g/ha	TS: 28d
DELTA EC	a	0,5 L/ha	TS: 7d

HERBICIDES: En cas de presència de males herbes, s'aconsella realitzar una aplicació per al seu control amb:

Per 400 L d'aigua	←	HERBOLEX	a	4 L
		MCPA	a	2 L
		RUEDO	a	0,1 L

ADV PLA DE LLEIDA